

PODOPS HORVATHI NOV. SPEC.,

DOOR

MR. A. J. F. FOKKER.

Pl. 1, fig. 1—3.

Fusco-testacea, capite jugis haud contiguïs, tylo percurrente nonnihilo brevioribus; tuberculis antenniferis crassis, satis longis, apice acute productis; antennis gracilibus, articulo secundo tertio plus quam duplo brevior, articulo quinto secundo et tertio simul sumtis paullo brevior, elongato, quarto paullo crassior, articulis antennarum II, III, IV et V fuscis basi ima pallidis; rostro coxas posticas attingente; thorace marginibus lateralibus anticis leviter sinuatis, sulco intramarginali his parallelo, processu collari brevi, dentiformi extrorsum vergente.

Long. $8\frac{1}{2}$ lat. $4\frac{3}{4}$ à 5 mm.

Lichaam ovaal, geelbruin, dicht en grof zwart bestippeld, hier en daar, vooral op kop en thorax boven- en onderzijde kort geelgrijs behaard.

Kop zwart; de zijlobben raken elkander van voren niet aan, de middellob (epistome, Stirnschwiele) is vrij en iets langer dan de zijlobben; de tuberkels waarop de sprieten staan (tubercules antennifères) zijn vrij lang en dik, met een klein tandje aan de binnenzijde, spits en naar buiten gebogen. De zuiger is roodbruin en reikt tot tusschen de achterheupen.

De sprieten zijn geel behaard, langer en slanker dan bij de andere soorten, het eerste lid zwart, de anderen, ook het vijfde, bruin, aan de basis zeer smal wit geringd; het eerste en tweede lid zijn te zamen bijna zoo lang als het derde; het derde is iets

langer dan het vierde; het vijfde langer dan het derde, een weinig korter dan het tweede en derde te zamen, dikker dan de overigen, doch minder dik en slanker dan bij de overige soorten. De lengte der sprietenleden is:

- | | | |
|----|------|-----|
| 1. | 0.50 | mm. |
| 2. | 0.38 | » |
| 3. | 0.90 | » |
| 4. | 0.85 | » |
| 5. | 1.25 | » |

Thorax met na het midden flauw naar binnen gebogen zijranden. De zijranden zijn geel, met zwart bestippeld en zeer fijn bruin gezoomd. De voorhoeken (Halsfortsätze) zijn zeer klein, tand- of doornvormig scheef naar buiten gericht, niet veel grooter dan de tand der schouderhoeken.

Schild aan de basis met twee kleine gele knobbeltjes, de hoek daarnaast zwart, veel langer dan het corium, zoo lang of iets langer dan het abdomen, voor het midden naar binnen gebogen en versmald, daarna weder iets verbreed. Schild en elytra zijn minder gelijkmatig dicht bestippeld, meer in vlekken en banden, waardoor midden over het schild in de lengte een bruine band, aan weerszijden door twee gele gebogen banden begrensd, zichtbaar is, en eveneens op het middenveld van het corium in de lengte een gele band. De aderen van clavus en corium zijn geel, gedeeltelijk met zwart bestippeld. De buitenrand van het corium is geel en onbestippeld.

De onderzijde is zwart, de zijranden van den thorax geel, gedeeltelijk zwart bestippeld, de achterhelft der metapleurae bruinachtig geel, een weinig zwart bestippeld.

De zijden van het achterlijf zijn buiten de stigmata helder geel, fijn gelijkkleurig bestippeld; aan de binnenzijde der stigmata is een breede band geel met grove zwarte stippels. Het midden van het achterlijf en de stigmata zijn zwart.

De pooten zijn zwart, de midden- en achterschenen en al de tarsen geel, de voorschenen bruin, de midden- en achterschenen aan de basis bruinzwart.

Deze soort is door hare grootte, den kleinen tand aan de voorhoeken van den thorax, het epistome, langer dan de zijlobben enz. zeer kennelijk van alle andere soorten van het geslacht *Podops* onderscheiden en past in geen der subgenera door Dr. von Horvath opgesteld.

Ik wijd ze aan Dr. Geza von Horvath te Pest, den schrijver der Monographie «die Europäischen Podoparien» (*Wiener Entom. Zeitung* van 1883).

Het eenige exemplaar (een ♀) in mijn bezit is gevangen in September 1890 in de omstreken van Bozen (Tyrol) door Mr. A. Brants, aan wiens bekwame teekenstift ook de bijgevoegde uitstekende afbeelding te danken is.

Augustus 1892.
